



Riqueza



HISTÓRIA

AS BORBOLETAS DEMONSTRAM POLIMORFISMO, MIMETISMO E APOSEMATISMO. ALGUMAS, COMO A BORBOLETA-MONARCA, MIGRAM LONGAS DISTÂNCIAS. ALGUMAS BORBOLETAS DESENVOLVERAM RELAÇÕES SIMBIÓTICAS E PARASÍTICAS COM INSECTOS SOCIAIS TAIS COMO AS FORMIGAS.



DESCRIÇÃO

PAPILIONIDAE É UMA FAMÍLIA DE INSECTOS DA ORDEM LEPIDOPTERA. É CARACTERIZADA POR BORBOLETAS GRANDES E COLORIDAS, O QUAL INCLUEM MAIS DE 550 ESPÉCIES. APESAR DA MAIORIA HABITAREM NOS TRÓPICOS, MEMBROS DA FAMÍLIA SÃO ENCONTRADOS EM TODOS OS CONTINENTES, MENOS NA ANTARTICA.



LOCALIZAÇÃO



As borboletas riqueza em São Tomé vivem nas montanhas de parque natural Ôbo

Ameaças

ENQUANTO OS FORNECIDOS PARA REGIÃO CENTRO-SUL NÃO ESTÃO PROTEGIDOS, ESPECIALMENTE AS ESPÉCIES ENDÊMICAS DOS CAMPOS NATURAIS. A PARTIR DOS NOVOS DADOS, SÃO SUGERIDAS AS SEGUINTE ALTERAÇÕES NA SITUAÇÃO DE AMEAÇA DAS ESPÉCIES: DESCARACTERIZAÇÃO DOS GRAUS DE AMEAÇA DE P. P. PRACTA, C. BERTHA E S. ARION. Z. Z. DIABO

Alimentação e reprodução

AS BORBOLETAS ALIMENTAM-SE DE FOLHAS DE URTIGA, PEQUENAS LAGARTAS, NÉCTAR DE FLORES E PARTES DE FRUTAS EM DECOMPOSIÇÃO

HABITAT

FAUNA DO PEDI É DOMINADA POR ESPÉCIES COMUMENTE ENCONTRADAS AO LONGO DAS BORDAS DAS FLORESTAS, EM HABITATS ABERTOS E FLORESTAS PERTURBADAS. COMO EXEMPLO, TODAS AS ESPÉCIES DE PIERIDAE REGISTRADAS NO LOCAL DE ESTUDO SÃO TÍPICAS DE FLORESTAS SECUNDÁRIAS E ÁREAS PERTURBADAS